



ETUDE DES FACTEURS INFLUENCANT LA
PRISE EN CHARGE EN CANCEROLOGIE DES
PATIENTS AGES : ETUDE REGIONALE
AUPRES DES MEDECINS GENERALISTES
D'AQUITAINE

Dr Marianne Fonck

Journées du Réseau de cancérologie d'Aquitaine

27 novembre 2008



Contexte (1)

- ❖ 30 % des tumeurs chez personnes âgées de plus de 75 ans

- ❖ Ne peut être définie seulement par l'âge chronologique, mais :
 - Barrière à l'accès aux soins (*Quaglia, Int. J. Cancer 2007*)
 - Prise en charge sous-optimale (perte de chance)
 - Des données cliniques encore fragmentaires (efficacité/toxicité) (*Turner, BMJ 1999*)



Contexte (2)

❖ Facteurs pouvant influencer la prise en charge :

(Votron Clin Oncol 2004 ; Monfardini Eur J Cancer 1996 ; Bouchardy J Clin Oncol 2007)

- Age du patient
- Acceptabilité du traitement
- Statut mental, présence de handicap
- Structures de prise en charge
- Attitude des MG
- Marginalisation sociale patients

=> Mais

❖ Etude Nord-Américaine *(Townsend J Clin Oncol 2003)*

Patients âgés adressés à une équipe de cancérologues

Différemment selon le stade du cancer



Objectifs

- Objectif principal
 - Décrire les éléments qui influencent les médecins généralistes (MG) d'Aquitaine dans leur décision d'adresser leurs patients âgés atteints de cancer à une équipe de cancérologues
- Objectifs secondaires
 - Estimer la proportion de MG qui adressent leurs patients âgés à une équipe de cancérologues
 - Identifier les facteurs associés à la décision d'adresser un patient âgé à une équipe de cancérologues
 - Identifier ces éléments en situation clinique



Méthodes

❖ Schéma d'étude

Étude transversale auprès d'un échantillon de MG d'Aquitaine exerçant une activité libérale en 2007

❖ Population source

- MG d'Aquitaine exerçant une activité libérale en 2007
- Échantillon aléatoire systématique stratifié sur le département : 1500 MG



Méthodes Questionnaire

- **Elaboré**
 - Par une méthode de consensus
 - Soumis experts
 - Testé auprès de 5 MG, modifié selon leurs remarques
- **Version finale**
 - Les patients âgés dans la patientèle du MG
 - La prise en charge par une équipe de oncologues des patients âgés atteints de cancer (3 questions clés)
 - *Adressez-vous un patient âgé atteint d'un cancer à une équipe de oncologues ? (stade précoce, stade avancé)*
 - *Quels éléments vous influencent ?*
 - Formations, et perception de l'organisation en France de la prise en charge des patients âgés atteints de cancer
 - Caractéristiques des MG
 - Deux cas cliniques (cancer de la prostate et cancer du colon)



Résultats

Analyse descriptive (1)

	Répondants		Total
	N	(%)	N
Dordogne	57	(33,5)	170
Gironde	172	(23,8)	724
Landes	60	(34,7)	173
Lot et Garonne	38	(31,7)	120
Pyrénées-Atlantiques	94	(30,0)	313
Départements non connus	15		
Total	436	(29,1)	1500

- 73,6 % d'hommes (321), âge moyen : 49,8 ans (28-70 ans)
- MG adressent **toujours** patients âgés susceptibles de présenter un cancer
 - À un stade précoce : 52,8 % MG (232)
 - À un stade avancé : 46,3 % MG (202)



Résultats

Analyse descriptive (2)

- Éléments influençant les MG
 - Liés aux patients
 - > 75 % : impossibilité de réaliser des investigations, présence de comorbidités, souhait de l'entourage, désir du patient
 - 50 – 75 % : âge chronologique, connaissance du diagnostic, espérance de vie courte, état psychologique
 - < 50 % : ressources financières
 - Liés au cancer
 - > 75 % : gravité des symptômes, effets secondaires du traitement
 - 50 – 75 % : localisation, stade
 - Liés à l'organisation
 - > 75 % : habitude de collaboration avec équipe de cancérologues
 - 50 – 75 % : difficultés organisationnelles (prise en charge), présence de recommandations, délai de prise en charge



Résultats

Cas cliniques

- **Cancer de la prostate**
 - 75 % MG adressent à un urologue
 - Influencés par
 - Localisation anatomique du cancer
 - Désir ou réticence du patient
 - Gravité des symptômes du cancer
- **Cancer du sigmoïde**
 - 45 % MG adressent à un gastroentérologue, 40 % MG adressent à un oncologue
 - Influencés par
 - Stade du cancer
 - Localisation anatomique du cancer
 - Gravité des symptômes du cancer



Résultats

Facteurs indépendants influençant les MG selon le stade du cancer (Analyses multivariées)

	RC	IC 95 %	p
« Stade précoce »			
Éléments influençant MG			
Difficultés organisationnelles	0,37	[0,24 – 0,56]	<0,0001
Localisation anatomique	0,58	[0,37 – 0,92]	0,02
« Stade avancé »			
Caractéristiques des MG			
Formation en cancérologie	1,85	[1,01 – 3,38]	0,05
Éléments influençant MG			
Age chronologique	0,55	[0,35 – 0,86]	0,009
Difficultés organisationnelles	0,60	[0,39 – 0,92]	0,02
Stade du cancer	0,43	[0,25 – 0,71]	0,001



Conclusion

- Facteurs indépendants de la décision d'adresser patients âgés atteints de cancer
 - Difficultés organisationnelles
 - Prise en charge complexe
 - Distance avec l'hôpital
 - Organisation des services spécialisés
 - Formation en cancérologie
 - Adaptée aux MG

