

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION
DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX DE LA LISTE « hors-GHS »
DANS LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES**

Publication : mars 2009

Révision : juillet 2009 (mise à jour de l'AMM de Gemzar®)

(AMM : Autorisation de mise sur le marché ; PTT : Situations temporairement acceptables ; SNA : Situations non acceptables)

| CANCERS GYNÉCOLOGIQUES | AMM | PTT | SNA |
|---|-----|-----|-----------------------|
| ▶ AVASTIN® - bevacizumab | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancer de l'ovaire avancé, lourdement prétraité (ex : chirurgie antérieure, plusieurs lignes de chimiothérapie antérieure...) et/ou avec facteur(s) physiopathologique(s) de risque de perforation digestive (ex : ulcères gastro-duodénaux). | | | X |
| ▶ CAELYX® - chlorhydrate de doxorubicine sous forme liposomale pégylée | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traitement d'un cancer ovarien à un stade avancé chez les femmes après l'échec d'une chimiothérapie de 1ère intention à base de platine. ▪ Cancères gynécologiques, en association aux taxanes. | X | | X |
| ▶ CAMPTO® - irinotecan | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancer de l'ovaire non à cellules claires, en 1ère ligne de chimiothérapie. ▪ Cancer de l'ovaire, non à cellules claires, en rechute, en association avec etoposide. ▪ Cancer de l'ovaire, non à cellules claires, en rechute, en association avec mitomycine C. ▪ Cancer de l'ovaire, non à cellules claires, en rechute, en association avec docetaxel. ▪ Cancer de l'ovaire, non à cellules claires, en rechute, en association avec doxorubicine. | | | X X X X X |
| ▶ FARMORUBICINE® et génériques - epirubicine | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancer de l'ovaire. | X | | |
| ▶ ERBITUX® - cetuximab | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancer du col de l'utérus avancé ou en rechute, en association au cisplatine et au topotecan. | | | X |
| ▶ GEMZAR® et génériques - gemcitabine | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ La gemcitabine est indiquée dans le traitement du carcinome épithélial de l'ovaire localement avancé ou métastatique, en association avec le carboplatine, chez les patientes en rechute suite à un intervalle sans récurrence d'au moins 6 mois après un traitement en première ligne à base de sels de platine. ▪ Cancer de l'ovaire, en 1ère ligne de traitement, en association avec carboplatine-paclitaxel ou cisplatine-paclitaxel. | X | | X |

